


Coqueluche (tosse convulsa ou tosse comprida)



Folheto explicativo



A coqueluche, ou "tosse convulsa" ou "tosse comprida", é causada por uma bactéria. Pessoas de todas as idades podem contrair coqueluche.



A coqueluche é transmitida pelo ar, geralmente por meio de tosse ou espirro. É necessário respirar as gotículas de uma pessoa doente.

Sinais e sintomas



Nariz escorrendo



Tosse



Vômito ou engasgo após tossir



Exaustão

Os primeiros sinais da coqueluche são semelhantes aos de um resfriado comum e incluem coriza, tosse leve e febre baixa ou ausência de febre. Depois de uma ou duas semanas de doença, a tosse muda e, com frequência, é repentina e incontrolável, com uma tosse seguida da outra sem pausa ou respiração. Pode ocorrer um som agudo, como um assobio, ao inspirar após um episódio de tosse.

A coqueluche pode ser tratada com antibióticos e é mais eficaz se o tratamento for iniciado precocemente. A tosse pode persistir por muitas semanas após o tratamento, principalmente quando o tratamento for iniciado no final da doença.

Prevenção



Lave as mãos com frequência



Cubra a tosse com a manga



Fique em casa quando estiver doente



Vacinação (DTaP para crianças, Tdap para adultos)

Para obter mais informações, acesse:



1. www.maine.gov/dhhs/pertussis
2. www.cdc.gov/pertussis

Você também pode entrar em contato com o Maine Center for Disease Control and Prevention (Centro para o Controle e Prevenção de Doenças em Maine) pelo telefone 1-800-821-5821.