


Poliomyélite (polio)

Fiche d'information



La poliomyélite, également connue sous le nom de polio, est une maladie provoquée par un virus qui survit dans la gorge et l'intestin. Le virus infiltre les ganglions lymphatiques et le système nerveux et peut provoquer des lésions nerveuses et une paralysie. La dernière infection de polio incontrôlée aux États-Unis remonte à 1979.



La polio se transmet d'une personne à l'autre par les sécrétions de la gorge. La polio peut également se transmettre par contact avec les selles d'une personne infectée.

Signes et symptômes




Fièvre



Fatigue



Nausées



Maux de tête

La plupart des personnes infectées par la polio ne présentent aucun signe ou symptôme. Les signes et les symptômes peuvent inclure la fièvre, la fatigue, des maux de tête, une raideur de la nuque et du dos et des douleurs dans les membres. La paralysie peut entraîner une invalidité permanente et la mort.

Prévention



La vaccination est le meilleur moyen de prévenir la polio et le seul moyen d'empêcher la propagation de la maladie.

Pour en savoir plus



Contactez votre médecin ou les Centres de contrôle et de prévention des maladies du Maine (*Maine Center for Disease Control and Prevention*) au 1-800-821-5821 pour plus d'informations.

Vous pouvez également consulter le site www.cdc.gov/polio.